

# ***MELLIORA KRÉM***

**Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!**

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!

## **Mi a Melliora krém?**

A Melliora krém gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, komponenseinek hatását szakirodalmi adatok igazolják.

Méhméreg: számos enzimet és fehérjét tartalmaz, fő komponense a mellitin, amely baktericid hatású, jelentős a gyulladásgátló hatása is.

Árnikatinktúra: flavonoid- és illóolaj-összetevői javítják a kezelt testfelület vérellátását, így csökkentik a reumás fájdalmakat és az izomhúzódás okozta panaszokat. A véraláfutások felszívódását elősegítik.

Racém kámfor: helyi vérbőséget idéz elő és fájdalomcsillapító hatású.

## **Mik a készítmény hatóanyagai?**

180 ME méhméreg (*Apis melliferae toxinum*), 3,0 g árnikatinktúra (*Arnicae tinctura*), 1,8 g racém kámfor (*Camphora racemica*) / 60 g

## **Mit tartalmaz még a Melliora krém?**

A készítmény segédanyagai: tisztított víz, 85 %-os glicerin, fehér vazelin, cetil-sztearil-alkohol, 96%-os etanol, folyékony paraffin, Carbopol 940, nátrium-lauril-szulfát, lecitin, nátrium-hidroxid, metil-parahidroxibenzoát.

## **Mikor alkalmazzuk a Melliora krémet?**

A készítmény ízületi gyulladások, reumatikus-, izom- és ízületi fájdalmak, valamint köszvény és isiász esetén alkalmazható a fájdalom csillapítására.

## **Mikor nem szabad alkalmazni a Melliora krémet?**

A készítmény bármely komponense iránti túlérzékenység (allergia) esetén nem alkalmazható.

## **Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?**

Tudnia kell, hogy nincs-e a készítmény alkotórészei iránti túlérzékenysége (allergiája).

## **Lehet-e a Melliora krémet más gyógyszerekkel együtt alkalmazni?**

Egyidejűleg egyéb reumaellenes, külsőleges készítménnyel együtt alkalmazni nem szabad, de más gyógyszeres, illetve fizioterápiás kezelés alkalmazható mellette. Amennyiben Ön más gyógyszereket is használ, kérje ki kezelőorvosa véleményét!

### **Mi a teendő várandósság, illetve szoptatás ideje alatt?**

A krém hatóanyagai bőrön keresztül jól felszívódnak, ezért a krém alkalmazása esetén kérje ki kezelőorvosa véleményét! A szoptatás ideje alatt ügyelni kell arra, hogy a készítmény véletlenül se kerüljön az emlőkre! A várandósság első harmadában a készítmény használata nem javasolt.

### **Hogyan kell a Melliora krémet alkalmazni?**

Bedörzsölőszerként használva a krémet a fájdalmas testrésze, illetve annak környékére kenjük kb. 1 mm-es vastagságban, majd óvatosan beledörzsöljük a bőrbe. A fájdalom erőssége szerint a kezelés többször is megismételhető, de legfeljebb naponta ötször.

Pakolásként alkalmazva a krém hatóanyagai jobban felszívódnak, ilyenkor a kezelendő testrészt 1-2 mm vastagon bekenjük, és vékony vászonnal átkötjük. A pakolást legalább fél óráig a fájó testrészen hagyjuk, közben néhányszor óvatosan mozgatjuk a kezelt ízületet.

### **Mire ügyeljen a Melliora krém alkalmazása során?**

Első használatkor csak kis bőrfelületen próbálja ki a krémet, mert annak alkotórészei ritkán allergiás reakciót válthatnak ki. A krém használata után alaposan mosson kezet! Vigyázzon, a krém ne kerüljön a szem környékére, arcra, nyílt sebre, vérző testrésze, nyálkahártyára!

Pakolásként alkalmazva csak vékony vásznot (pamut vagy len) használjon, a kezelt felületet nem szabad légmentesen lezárni.

Ha orvosi kezelés alatt áll, tájékoztassa kezelőorvosát a krém használatáról!

### **Mennyi ideig alkalmazható a Melliora krém?**

Kúraszerű alkalmazása 3-4 hétig javasolt. A két kúra között legalább 2 hét szünetet kell tartani! A krém kúraszerű alkalmazását előnyös kiegészíteni a megfelelő gyógyszeres, illetve fizioterápiás kezeléssel.

### **Milyen mellékhatásai lehetnek a Melliora krémnek?**

Kámforra érzékeny egyéneknél allergiás reakciót válthat ki (kontakt ekcéma). A méhmemreg, árnikatinktúra és a metil-parahidroxibenzoát is kiválthat ritkán allergiás reakciót (tartós bőrpír, viszketés, duzzanat). Az allergiás tünet, illetve bármely szokatlan tünet esetén szakítsa meg a kezelést, és beszéljen kezelőorvosával!

### **Hogyan kell tárolni a Melliora krémet?**

Legfeljebb 25°C-on, fénytől védve.

Gyermekektől elzárva tartandó!

### **Mennyi ideig tárolható a Melliora krém?**

A krémet csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

**Csomagolási egység:** 60 g

**Nyilvántartási szám:** OGYI-238/1991

### **Forgalomba hozatali engedély jogosultja:**

Natureland Egészségcentrum Zrt.

2051 Biatorbágy, Juhász Gyula u. 27.