

LÉGZÉSKÖNNYÍTŐ MELLKENŐCS GYERMEKEKNEK

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, légúti panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!

A mellkenőcs gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását szakirodalmi adatok igazolják.

A készítmény összetevőinek fontosabb jellemzői:

Az összetevők flavonoid-, karotinoid- és illóolaj-komponensei enyhe gyulladáscsökkentő, baktérium- és gombaölő hatásúak. Az illóolajok oldják a hörgők görcsét, elősegítik a váladék kiürülését a hörgőkből.

Mi a Légzéskönnýtő mellkenőcs gyermekeknek hatóanyaga?

1 g kenőcsben: 50,0 mg körömvirág- és kamillavirágzat- (*Calendula officinalis* L., *flos et Matricaria recutita* L., *flos*) kivonat (kivonószer: trigliceridek - 96%-os etanol), 10,0 mg eukaliptuszolaj (*Eucalypti aetheroleum*), 10,0 mg malabár-olajfű illóolaj (*Cymbopogoni aetheroleum*), 5,0 mg kakukkfűolaj (*Thymi aetheroleum*), 5,0 mg ánizsolaj (*Anisi aetheroleum*).

Mit tartalmaz még a Légzéskönnýtő mellkenőcs gyermekeknek?

A kenőcs segédanyagai: fehér vazelin, Liquapar olaj (parahidroxibenzoát-észtereket tartalmaz).

Mikor alkalmazható a Légzéskönnýtő mellkenőcs?

A mellkenőcs használata meghűlés, felső légúti fertőzések és hurutok, valamint köhögés és hörghurut kiegészítő kezelésére ajánlott. Köptető és görcsoldó hatása révén krónikus hörghurut esetén is alkalmazható.

Mikor nem szabad alkalmazni a Légzéskönnýtő mellkenőcsöt?

A készítmény nem alkalmazható hörgi asztma és számarköhögés, valamint a készítmény bármely komponensével szembeni egyéni túlérzékenység (allergia) esetén.

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?

Amennyiben bizonytalan a készítmény alkalmazhatóságát illetően, úgy használat előtt borsónyi kenőccsel végezzen bőrpróbát!

Lehet-e a Légzéskönnýtő mellkenőcsöt más gyógyszerekkel együtt alkalmazni?

Más mellkenőccsel egyidejűleg alkalmazni nem szabad, de egyéb gyógyszeres kezelés mellett használható.

Hány éves kortól javasolt a Légzéskönnýtő mellkenőcs gyermekeknek alkalmazása?

Alkalmazása 2 éves kortól javasolt.

Hogyan kell a Légzéskönnyítő mellkenőcsöt alkalmazni?

A mellkas felső részének középvezetékét vékonyan kenjük be a kenőccsel, majd gyengéden masszírozzuk a bőrbe, és száraz gyapjú vagy lenvászon ruhával takarjuk be! A kenőccsel naponta 2-3 alkalommal kezeljük a gyermeket!

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek?

Fészkésvirágzatúakkal, illóolaj-komponensekkel és parahidroxibenzoát észterek-kel szembeni egyéni túlérzékenység (allergia) esetén allergiás bőrreakciók léphetnek fel, valamint a hörgők görcse felerősödhet.

Ha Ön olyan mellékhatást észlel a gyermekén, ami nem múlik el, hagyja abba a kenőcs alkalmazását!

Mire ügyeljen a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek alkalmazása során?

Ügyeljen arra, hogy a kenőcs szembe, szem környékére, illetve nyálkahártyára (különösen orr- vagy szájnyálkahártya) ne kerüljön! Ha szembe vagy nyálkahártyára kerül, azonnal le kell mosni hideg vízzel! Ha a gyermek mellkasán a bőr gyulladt vagy sérült, ne használja a készítményt!

Mennyi ideig alkalmazható a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek?

Kúraszerű alkalmazása legfeljebb 6-7 napig javasolt. Amennyiben a gyermek állapota egy heti kezelés után sem javul, keresse fel gyermekorvosát!

Hogyan kell tárolni a Légzéskönnyítő mellkenőcsöt?

Legfeljebb 25 °C-on, fénytől védve.

Gyermekektől elzárva tartandó!

Mennyi ideig használható fel a Légzéskönnyítő mellkenőcs gyermekeknek?

A kenőcsöt csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Csomagolási egység: 20 g, 70 g / tubus

Nyilvántartási szám: OGYI-886/2002

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Natureland Egészségcentrum Zrt.

2051 Biatorbágy, Juhász Gyula u. 27.