

REERGIN TABLETTA

Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!

Tulajdonság, hatás:

- ◆ A tabletták gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, szellemi és fizikai regeneráló hatását orvosi vizsgálatok igazolják.
- ◆ A glutaminsav és aszparaginsav bevitele csökkenti a sajátfehérje-lebontás mértékét, ezáltal elősegíti és meggyorsítja a szervezet szellemi és fizikai kifáradását követő regenerálódását.

Mi a Reergin tabletták hatóanyaga?

1 tablettában: 266,6 mg glutaminsav (*Acidum glutamicum*), 133,3 mg aszparaginsav (*Acidum asparticum*).

Mit tartalmaz még a Reergin tabletták?

A készítmény segédanyagai: burgonyakeményítő, zselatin, 85%-os glicerin, magnézium-sztearát, talkum, szacharóz.

Mikor ajánlott a Reergin tabletták szedése?

A tabletták a szervezet fizikai vagy szellemi kifáradásakor alkalmazható a regenerálódás elősegítésére. Akár átmeneti, akár tartós fizikai vagy szellemi igénybevételkor a tabletták szedése csökkenti a fáradtságérzetet, javítja a koncentráció képességet.

Mikor nem javasolt a Reergin tabletták szedése?

Vesebetegség esetén a tabletták nem alkalmazható.

Mit kell tudnia a Reergin tabletták szedésének megkezdése előtt?

A tabletták burgonyakeményítőt tartalmaz.

Szedhetik-e a Reergin tablettát gyermekek is?

Gyermekeken vizsgálatokat nem végeztek. Alkalmazása gyermekkorban nem ajánlott.

Lehet-e a Reergin tablettát más gyógyszerekkel egyidejűleg szedni?

Jelenleg nem ismertek olyan adatok, amelyek a Reergin tabletták más gyógyszerrel történő együtt-alkalmazását kizárnák.

Szedhetik-e a Reergin tablettát várandós és szoptató anyák?

A tabletták alkalmazása ezen élethelyzetekben nem javasolt.

Hogyan kell a Reergin tablettát alkalmazni?

A tablettát étkezés közben javasolt bevenni.

Mi a Reergin tabletta ajánlott adagja?

- Átmeneti fizikai igénybevétel esetén reggel és délben 1-1 tabletta.
- Tartós fizikai igénybevétel során reggel és délben 2-2 tabletta és este 1 tabletta.
- Fokozott szellemi igénybevételkor reggel 1/2, délben 1 tabletta.

Mire kell ügyelni a Reergin tabletta alkalmazása során?

Hasonló hatású más készítménnyel egyidejűleg nem szedhető.

Mennyi ideig alkalmazható a Reergin tabletta?

A tabletta szedése kúraszerűen nem javasolt.

Milyen nem várt hatásai lehetnek a Reergin tablettának?

A tabletta szedésekor az alvás felszínessé válhat; ebben az esetben a készítmény alkalmazását abba kell hagyni!

Hogyan kell tárolni a Reergin tablettát?

Legfeljebb 25 °C-on.

Gyermekektől elzárva tartandó!

Mennyi ideig tárolható a Reergin tabletta?

A tablettát csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Nyilvántartási szám: OGYI-015/1987

Csomagolási egység: 20 db, 60 db / doboz

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Natureland Egészségcentrum Zrt.

2051 Biatorbágy, Juhász Gyula u. 27.