

# ***HERPESIL GÉL***

**Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!**

E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön a száj és orr környékén jelentkező Herpes simplex (I.) vírusfertőzést kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő, előírás szerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!

## **Tulajdonság, hatás:**

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását kísérletek igazolják. A készítmény komponenseinek a Herpes simplex (I.) víruszaporodást gátló (citromfű), gyulladáscsökkentő (kamillavirágzat, kanadai és magas aranyvessző virágos hajtás, tüdőfű-levél), fertőtlenítő, bakteriális utófertőzést gátló (vérehulló fecskefű virágos hajtás, kerti és spanyol kakukkfű levél és virág, kamillavirágzat), sebgyógyító (cink-szulfát-heptahidrát, vérehulló fecskefű virágos hajtás) hatását szakirodalmi adatok igazolják.

## **Mi a Herpesil gél hatóanyaga?**

1 g gélben 0,40 g Herpesil kivonat [orvosi citromfű leveles szár (*Melissae herba*), kamillavirágzat (*Matricariae flos*), vérehulló fecskefű virágos hajtás (*Chelidonii herba*), kanadai és magas aranyvessző virágos hajtás (*Solidaginis herba*), tüdőfű-levél (*Pulmonariae folium*), kerti és spanyol kakukkfű levél és virág (*Thymi herba*) alkoholos kivonata és 0,10% cink-szulfát-heptahidrát (*Zinci sulfas heptahydricus*)].

## **Mit tartalmaz még a Herpesil gél?**

A készítmény segédanyagai: tisztított víz, 85%-os glicerin, Carbopol 940, poliszorbát 20, trolamin, szorbinsav.

## **Mikor alkalmazható a Herpesil gél?**

A gél a száj és az orr környékén jelentkező Herpes simplex (I.) vírusfertőzés helyi kezelésére alkalmazható. A kezelés lerövidíti a gyógyulási időt, késlelteti az esetlegesen kiújuló tüneteket, valamint elősegíti a nyálkahártya és a bőrsérülés gyógyulását.

## **Mikor nem szabad alkalmazni a Herpesil gélt?**

A készítmény nem alkalmazható abban az esetben, ha szemén vagy a szem környékén fordul elő a vírusfertőzés.

## **Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?**

Tudnia kell, hogy nincs-e az alkotórészek iránt túlérzékenysége (allergiája)!

## **Alkalmazhatják-e a Herpesil gélt gyermekek is?**

Gyermekek csak az orvos utasítására, a kezelőorvossal történt megbeszélés alapján alkalmazhatják a készítményt.

**Lehet-e a Herpesil gélt más gyógyszerekkel együtt alkalmazni?**

Más gyógyszerekkel való együttes alkalmazást kizáró adat nem ismert, de ha Ön a készítményt más gyógyszerrel együtt használja, kérje ki kezelőorvosa véleményét az alkalmazhatóságról!

**Mit kell megfontolnia, ha Ön várandós vagy szoptat?**

A várandósság első harmadában a készítményt ne használja, továbbiakban a készítmény alkalmazhatóságát beszélje meg kezelőorvosával!

**Hogyan kell a Herpesil gélt alkalmazni?**

Naponta 1-3 alkalommal, illetve éjszakára vékonyan kenje be a géllal a száj vagy az orr környékét, ahol a pörkők kialakultak.

**Milyen mellékhatásai lehetnek a Herpesil gélnek?**

Egyes esetekben az alkotórészek bármelyike iránt túlérzékeny egyéneknél allergiás reakció jelentkezhet. Ha Ön bármilyen szokatlan tünetet észlel, hagyja abba a kezelést és keresse fel kezelőorvosát!

**Mire ügyeljen a Herpesil gél alkalmazása során?**

A készítmény használata után mosson kezet, vigyázzon arra, hogy a gél a szembe vagy a szem környékére ne kerüljön!

**Mennyi ideig alkalmazható a Herpesil gél?**

Abban az esetben, ha tünetei öt napos kezelést követően nem csökkennek, illetve nem szűnnek meg, hagyja abba a kezelést és keresse fel kezelőorvosát!

**Hogyan kell tárolni a Herpesil gélt?**

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.  
Gyermekektől elzárva tartandó!

**Mennyi ideig használható fel a Herpesil gél?**

A gélt csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

**Csomagolási egység:** 10 g / tubus

**Nyilvántartási szám:** OGYI-060/1988

**Forgalomba hozatali engedély jogosultja:**

Natureland Egészségcentrum Zrt.  
2051 Biatorbágy, Juhász Gyula u. 27.