

Propolisz + C-vitamin szopogató tablettá

Mielőtt elkezd alkalmazni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz!

Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza!

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!

Tulajdonság, hatás:

A tablettá gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, hatását szakirodalmi adatok igazolják.

A készítmény hatásáért felelős összetevőinek fontosabb jellemzői:

A **propoliszkivonat** főbb komponensei (flavonoidok, növényi savak, polifenol-alkoholok, ásványi sók) baktérium- és gombaölő hatással rendelkeznek.

Az **aszorbinsav (C-vitamin)** növeli a szervezet ellenálló képességét.

Mi a Propolisz + C-vitamin szopogató tablettá hatóanyaga?

1 tablettá tartalma: 37,5 mg propoliszkivonat (Propolisz E-50) legalább 14 mg összpolidenoltartalommal, 50,0 mg aszorbinsav (*Acidum ascorbicum*).

Mit tartalmaz még a Propolisz + C-vitamin szopogató tablettá?

A készítmény segédanyagai: glükóz-monohidrát (kb. 849 mg/tablettá), magnézium-sztearát.

Mikor alkalmazható a Propolisz + C-vitamin szopogató tablettá?

A tablettá különböző felső légúti megbetegedések (szájüregi és torokgyulladások) megelőzésére, a panaszok enyhítésére, a húgyúti és gyomor–bélrendszerben fellépő gyulladások kiegészítő kezelésére, valamint a szervezet védekezőképességének erősítésére alkalmazható.

Mikor nem szabad alkalmazni a Propolisz + C-vitamin szopogató tablettát?

Az alkotó komponensek bármelyike (pl. propolisz) és/vagy virágpor iránti túlérzékenység (allergia) esetén a tablettá nem alkalmazható.

Mit kell tudnia a Propolisz + C-vitamin szopogató tablettá alkalmazásának megkezdése előtt?

Tudnia kell, hogy nincs-e az alkotórészek iránti túlérzékenysége (allergiája).

Ha panaszai ismeretlen eredetűek, esetleg gyógykezelés alatt áll, a készítmény alkalmazásának megkezdése előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Alkalmazhatják-e gyermekek a Propolisz + C-vitamin szopogató tablettát?

Gyermekeknél történő alkalmazásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.

Lehet-e a Propolisz + C-vitamin szopogató tablettát gyógyszerekkel együtt alkalmazni?

Gyógyszerekkel együtt alkalmazható, de az egyidejűleg szedett antibiotikumok hatását fokozhatja. Amennyiben Ön gyógyszert is szed, kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Más gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása során figyelembe kell venni, hogy ha az összes napi C-vitamin-bevitel meghaladja az 1000 mg-ot, akkor bizonyos gyógyszerek hatása megváltozhat,

valamint gyomorégés, émelygés, hányinger, hasmenés előfordulhat, és megnövekedhet az oxalát típusú vesekőképződés veszélye.

Óvatosan alkalmazható együtt a következő hatóanyag-tartalmú gyógyszerekkel:

- vas-, réz- és szeléntartalmú készítmények
- dezferoxamin (vastúlادagolás kezelésére szolgáló gyógyszer)
- mexiletin (szívritmuszavarok kezelésére szolgáló gyógyszer)
- kumarin- és indandionszármazékok (véralvadásgátló gyógyszerek)
- szalicilsavszármazékok (fájdalom-, lázcsillapító és gyulladásgátló gyógyszerek)
- diszulfiram (alkoholbetegség kezelésére szolgáló gyógyszer)

Nagy adag aszkorbinsav a vizelet pH-ját csökkentheti, amely a savas jellegű hatóanyagok újra felszívódását növelheti, illetve a lúgos jellegűek újra felszívódását csökkentheti.

Nagy dózisú C-vitamin egyes laboratóriumi vizsgálatok eredményét megváltoztathatja, ezért a laboratóriumi vizsgálatot elrendelő orvost tájékoztassa arról, ha Ön C-vitamint szed.

Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket szeretne?

Ha Ön várandós vagy szoptat, illetve gyermeket szeretne, a tabletták alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével!

Hogyan kell a Propolisz + C-vitamin szopogató tablettát alkalmazni?

A tablettát lassan kell elszopogatni, utána kb. 30 percen át az étkezést és folyadékfogyasztást kerülni szükséges.

Mi az ajánlott adag?

Felnőtteknek naponta 3 x 1–3 tablettát lassan elszopogatni!

Milyen mellékhatásai lehetnek a Propolisz + C-vitamin szopogató tablettának?

Propoliszra és/vagy virágporra túlérzékeny egyéneknél allergiás reakciót válthat ki.

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, hagyja abba a kezelést, és tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

Mennyi ideig alkalmazható a Propolisz + C-vitamin szopogató tabletták?

Felső légúti panaszok, egyéb gyulladások kezelésére 4–5 napig, megelőzés céljából 2 hétig javasolt a tabletták alkalmazása.

Hogyan kell tárolni a Propolisz + C-vitamin szopogató tablettát?

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

Gyermekektől elzárva tartandó!

Mennyi ideig használható fel a Propolisz + C-vitamin szopogató tabletták?

A tablettát csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Nyilvántartási szám: OGYI-010/1986

Milyen a szopogató tabletták külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Leírás: Homogén felületű, halvány barna színű, mézszagú, édeskés ízű, lapos, peremes, jelzés nélküli, préselt, szopogató tabletták.

Csomagolás: Buborékcsomagolásban [alumínium + barna színű poli(vinil-klorid)] és dobozban.

Csomagolási egység: 20 db, 60 db / doboz

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Natureland Egészségcentrum Zrt.

3060 Pásztó, NATURLAND Park